

ADHD – ordinationsvejledning til lægen

Introduktion

ADHD er en almindeligt forekommende neuropsykiatrisk lidelse hos børn og unge. Der anbefales en multimodal behandling for ADHD, hvor methylphenidat (MPH) ofte ordineres. Som ved enhver anden medicinsk behandling skal der udføres en grundig vurdering af både fordele og ulemper inden påbegyndelse af behandlingen.

På grund af MPH's stimulerende egenskaber og den hyppige tilstedeværelse af komorbiditeter, der er knyttet til ADHD, er det vigtigt, at MPH-lægemidler anvendes ensartet og udelukkende til de rigtige patienter. Med udgangspunkt i dette, har Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) evalueret produktresuméerne for MPH-produkter og er fremkommet med anbefalinger.

Det medfølgende materiale er udviklet af producenterne af MPH-lægemidler med henblik på at fremme kendskab til og anvendelse af anbefalingerne vedrørende brug af MPH. Det anbefales, at det medfølgende materiale anvendes sammen med produktresumeeet for Methylphenidate Stada.

Ud over produktresumeeet er følgende værktøjer tilgængelige:

- En tjekliste, der skal gennemgås/udfyldes inden påbegyndelse af MPH-behandling: Tjekliste 1 – Tjekliste for methylphenidat (MPH) inden ordinerings
- En tjekliste, der skal gennemgås/udfyldes under igangværende behandling med MPH: Tjekliste 2 – Tjekliste for methylphenidat (MPH) til monitorering af igangværende behandling
- Et skema til løbende monitorering under behandling med MPH

Formålet med tjeklisterne er at give dig en lettilgængelig oversigt over, hvad patienten skal undersøges for inden ordination af MPH samt under igangværende behandling.

Detaljerede oplysninger findes i produktresumeeet samt indlægssedlen for Methylphenidate Stada.

Methylphenidat (MPH) som en del af et omfattende behandlingsprogram

Passende placering i uddannelsessystemet er vigtig ved behandling af ADHD og det er generelt nødvendigt med psykosocial intervention. Hvor afhjælpende foranstaltninger viser sig at være utilstrækkelige, skal beslutningen om at ordinere MPH baseres på en stringent vurdering af sværhedsgraden af det enkelte barns symptomer.

Farmakoterapi med MPH er indiceret som en del af et omfattende behandlingsprogram for ADHD.

Med henblik på at sikre, at brugen af MPH altid tager udgangspunkt i ovenstående, skal følgende overvejes:

- Diagnose er stillet ud fra grundig vurdering af sværhedsgraden og kronicitet/varigheden af barnets symptomer i forhold til barnets alder
- Diagnose er stillet i henhold til kriterierne i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) eller retningslinjerne i International Classification of Diseases (ICD) og baseret på en komplet anamnese for og vurdering af patienten
- Sørg for, at der anvendes lægelige samt specialiserede psykologiske, uddannelsesmæssige og sociale ressourcer

For yderligere oplysning se endvidere produktresumeeet for Methylphenidate Stada.